

LES DERNIÈRES DESCRIPTIONS DE L'ABBÉ PROVANCHER


ORDRE DES NÉVROPTÈRES

Fam. VI. *ÆSCHNIDÆ*

Anax maritime. Anax maritimus, n. sp.

♂—Long. 2.50 pes; expansion des ailes : 3.50 pes. D'un beau jaune brunâtre, submétallique ; la face blanchâtre avec une bande brune transverse au-dessus du chaperon et une tache noire en forme de T sur le vertex, velue. Le thorax avec 2 lignes pâles obliques sur les côtés non distinctement marquées. Ailes hyalines, le stigma jaune, non très allongé, la membrane méliocère brunâtre, blanche à la base. Abdomen portant de chaque côté une carène interrompue aux sutures, assez grêle, mais renflé à la base qui porte une villosité blanchâtre, le 2e segment non auriculé, mais portant à son milieu une petite bande transverse jaune bordée de noir interrompue au milieu ; les segments terminaux sont plus ou moins tachés de jaune à leur sommet. Appendices supérieurs noirs, velus, linéaires ovales, terminés en pointe au sommet, les inférieurs très courts. Pattes d'un roux brunâtre avec les épines noires. Tout le dessous du corps à villosité blanchâtre.

Pris un seul exemplaire ♂ aux Iles-de-la-Madeleine, malheureusement tout frais éclos, de sorte que sa coloration n'était pas encore très nettement prononcée, suffisamment cependant pour faire reconnaître que c'était une espèce différente de celles déjà décrites. (*)



ORDRE DES HYMENOPTÈRES

Fam. I. *TENTHREDINIDÆ*

Némate à-4-yeux. Nematus tetraopsis, n. sp.

♀—Long. .31 pes. Jaune-miel avec taches noires. La face jaune avec deux points enfoncés noirs en avant des antennes

(*) Le spécimen-type se trouve au Musée du Parlement, Québec.

et deux autres en arrière, l'extrémité des mandibules, avec une tache sur le vertex à l'endroit des ocelles, et les antennes, noir, celles-ci aussi longues que le thorax avec les articles 1, 2 et 3 presque d'égale longueur. Le dos de chacun des lobes du mésothorax, le métathorax avec les sutures de ses flancs, la pointe de l'écusson, une tache au-dessus des hanches antérieures, une autre au-dessus des postérieures sur les flancs du métathorax, noir; les quatre trochantins postérieurs blancs. Ailes hyalines, légèrement enfumées, les nervures noires, le stigma jaune entouré d'une ligne noire. Pattes de la couleur du corps, les tarsi postérieurs légèrement obscurcis à l'extrémité. Abdomen jaune-miel, sans aucune tache. —Los Angeles (Coquillett).

Var. Sans tache noire au-dessus des hanches antérieures.

Voisin du *s. pomum*, Walsh, du *mendicans*, Walsh, mais s'en distinguant surtout par les gros points noirs de sa face, et son abdomen sans aucune tache (*).

— *Monophadnae pieds-pâles*: *Monophadnus pallipes*, n. sp.

♀—Long. 16 pce. Tête noire, sans autre tache que le charperon transversal qui est blanc. Antennes courtes. Thorax noir, le prothorax, les bords des lobes du mésothorax, les écailles alaires avec les flancs, jaune pâle, les sutures des flancs du métathorax, avec une tache à la poitrine, noir. Ailes hyalines, les nervures brunes, le stigma jaune; les ailes postérieures avec une seule cellule discoïdale. Pattes jaune pâle, les cuisses postérieures avec une strie noire en dedans, les tarsi plus ou moins obscurs. Abdomen allongé, cylindrique, noir en dessus, blanc en dessous, le blanc remontant sur les côtés de manière à denticuler chaque segment, l'anus blanc, les valves de la tarière noires.—Los Angeles (Coquillett).

♂—N'ayant que les côtés de l'abdomen blancs, les pattes plus ou moins obscurcies, les hanches noires tachées de blanc. (**)

(A suivre)

(*) Le type se trouve au Musée du Parlement, Québec.

(**) Nous avons vu aussi un spécimen de cette espèce au Musée du Parlement de Québec sans remarquer si c'était le ♂ ou la ♀.—RÉD.